





Eulen Und Käuze





Schleiereule (Tyto alba)

- **Körperlänge:** 33-39cm
- **Verbreitung:** Afrika, Europa, Australien, Schottland, Dänemark
- **Lebensraum:** Dörfer mit umliegenden Feldern, Nachtaktiver Standvogel
- **Merkmale:** lange Flügel und Beine, Schleier hell und herzförmig, Iris dunkel, im Jagdflug schnell, sonst langsam, Oberseite grau und hell braun, Unterseite weiß
- **Nahrung:** Wühlmäuse, Spitzmäuse, Ratten, Vögel
- **Fortpflanzung:** brütet in dunklen Räumen, Kirchtürmen, Scheunen, Dachböden, Eiablage ab März, 2 Jahresbruten, 4-7 weiße Eier, Weibchen brütet 30-34 Tage lang, Männchen bringt das Futter, die Junge sind mit 60 Tagen flügge, mit 10 Wochen selbständig
- **Stimme:** Ruf des Weibchens wie ein Schrei, Warnruf im Flug heiseres Quietschen, Gesang schreiend „schrrrrrii“ wird wiederholt, Bettelruf der Jungvögel keuchendes schnarchen
- **Ordnung:** Eulen
- **Familie:** Schleiereulen
- **Gattung:** Schleiereulen



Schleiereulen
Verbreitung

Schleiereule

Schleiereulen Eier



Schleiereule



Schleiereulen Abbildung

Schleiereule mit Jungen

Sumpfohreule (Asio flammeus)

- **Körperlänge:** 33-40cm
- **Verbreitung:** Karibik, Hawaii, Türkei, Großbritannien, Ukraine, Teile Europa
- **Lebensraum:** Heideflächen, Wiesen, Büschen, Mooren, teilweise Tagaktiv
- **Merkmale:** lange Spitze Flügel, Federohr klein, Gefieder gelblichbraun und gestreift, Gesicht mit schwarzer Augenumrandung, gelbe Iris, fliegt schaukelnd, ungestreifter Bauch, grob gebänderter Schwanz, **Männchen** im Gesicht blasser und schwächer gestreift, **Weibchen** sonst gleich
- **Nahrung:** nur Wühlmäuse sonst, Ratten, Waldmäuse, Kaninchen, Vögel
- **Fortpflanzung:** Bodenbrüter, baut das Nest aus Halmen, 1-2 Jahresbruten, 4-8 weiße Eier, Weibchen brütet 26-27 Tage, Männchen sorgt für Nahrung, die Jungen zerstreuen sich mit 12-15 Tagen, mit 24-27 Tagen sind sie flügge
- **Stimme:** Weibchen ruft „TSCHIH-eff“, bettelnd „TSCHIII-op“, Warnruf rau „tschef-tschef-tschef“, Gesang tiefe, dumpfe Töne
- **Ordnung:** Eulen
- **Familie:** Eigentliche Eulen
- **Gattung:** Ohreulen





Sumpfohreule im Flug

Sumpfohreule

**Sumpfohreulen
Jungvogel**



**Sumpfohreule
Sumpfohreulen Nest
(Mitte)**



**Sumpfohreulen
Abbildung**

**Sumpfohreulen
Verbreitung**

Uhu (Bubo bubo)

- **Körperlänge:** 59-73cm
- **Gewicht:** 2300-4200g
- **Verbreitung:** Europa, Asien
- **Lebensraum:** Gebirge, Wälder mit Felsen und alten Bäumen, Nachtaktiver Standvogel
- **Merkmale:** Federohren die bei Ruhe waagrecht und bei Störung aufgestellt sind, fliegt langsam, Augen orangerot, Gefieder Unterseite hellbraun, dunkel gestreift, Oberseite dunkler braun und kräftiger gestreift, Kehle weiß, Handschwingenbasen gelblichbraun, **Jugendkleid** großer Schnabel und Krallen, Ästlinge nach einigen Wochen befiedert
- **Nahrung:** Hasen, Kaninchen, Igel, Krähen, Feldmaus, Vögel wie andere Greifvögel und Eulen
- **Fortpflanzung:** brütet in Felsnischen oder Horsten, Eiablage im März/April, 2-4 weiße Eier, Weibchen brütet 30-36 Tage und wird vom Männchen versorgt, die Jungen verlassen mit 5-7 Wochen das Nest und sind mit 9 Wochen flügge, mit 20 Wochen fliegen sie aus
- **Stimme:** **Weibchen** ruft rau „RHÄew“, Warnruf laut „KWA“ und wird wiederholt, bei Beunruhigung „gao“, Gesang tief „UU-hu“, manche **Männchen** rufen nicht oft, Weibchen ruft laut bei Bettelrufen „tschullsch“
- **Ordnung:** Eulen
- **Familie:** Eigentliche Eulen
- **Gattung:** Uhus

Uhu

Uhu Nest



Uhu mit waagerechte aufgestellten Federohren (normal)



Uhu Abbildung



Uhu mit senkrecht aufgestellten Federohren (Gefahr)

Waldohreule (*Asio otus*)

- **Körperlänge:** 31-37cm
- **Gewicht:** Männchen 220-280g Weibchen 250-370g
- **Verbreitung:**
Großbritannien, Irland, China, Japan, Kanada, Teile Europa
- **Lebensraum:** Wälder mit offenen Flächen, Nacht- und Dämmerungsaktiver Standvogel
- **Merkmale:** lange und schmale Flügel, lange Federohren bei Balz, fliegt langsam, dunkle Flügelspitze, Iris orange, weißer Armschwingenhinterrand, Flügel grau, gestreifte Körperunterseite, Männchen heller, Unterseite schwächer gestreift, Gesicht weniger rötlich, sonst Weibchen gleich
- **Nahrung:** Feldmäuse, Vögel, andere Kleintiere
- **Fortpflanzung:** Brutet in Nadelwälder in den Nestern von anderen Vögeln, Eiablage März/April, 4-5 weiße Eier, Weibchen brütet 27-28 Tage, mit 20 Tagen verlassen die Jungen das Nest, mit 35 sind sie flügge
- **Stimme:** Weibchen ruft schwach wiederholt „PIH-äw“, Arlamruf krächzend „wräck wräck-wräck“, manchmal singen Weibchen und Männchen im Duett, Bettelrufe laut „PII-ih“
- **Ordnung:** Eulen
- **Familie:** Eigentliche Eulen
- **Gattung:** Ohreulen

Waldohreule

Waldohreulen Nest



Waldohreule Waldohreule im Flug (Mitte)



Waldohreulen Junge (Ästlinge)



Waldohreulen Abbildung

Raufußkauz (*Aegolius funerus*)

- **Körperlänge:** 22-27cm
- **Gewicht:** Männchen 115g
Weibchen 200g
- **Verbreitung:**
Mitteleuropa,
Nordgriechenland,
Niederlande, Polen,
Ostbelgien, Finnland
- **Lebensraum:**
Mischwälder im Bergland,
mit Mooren, Nachtaktiver
Standvogel
- **Merkmale:** Iris gelb,
Oberseite braun,
Schulterfedern weiß
gefleckt, Unterseite
weißlich mit braunen
Flecken, fliegt gleitend,
Jugendkleid braun mit
weißlichem Gesichtsanteil
- **Nahrung:** viele
Wühlmäuse, sonst
Waldmäuse, Vögel,
Spitzmäuse
- **Fortpflanzung:**
Höhlenbrüter, 2-8
Jahresbruten, 3-6 weiße
Eier, Weibchen brütet 26-
29 Tage, Männchen
besorgt Futter, die Jungen
bleiben 30-34 Tage lang im
Nest, mit 4 Wochen sind
sie selbstständig
- **Stimme:** Ruft „tschiAK“,
Bettelrufe der Jungen
„ksi“, Gesang schnelle
Pfeiftöne
- **Ordnung:** Eulen
- **Familie:** Eigentliche Eulen
- **Gattung:** *Aegolius*




Raufußkauz Nest

Raufußkauz


Raufußkauz Jungvögel



Raufußkauz



**Raufußkauz
Verbreitung**



**Raufußkauz
Abbildung**

Steinkauz

Steinkauz Höhle



Steinkauz



Steinkauz Abbildung

Steinkauz Jungvogel

Steinkauz (Athene noctua)

- **Körperlänge:** 23-27cm
- **Gewicht:** Männchen 160-240g Weibchen 170-250g
- **Verbreitung:** Holland, Dänemark, Belgien, Moskau, in Teilen Europa
- **Lebensraum:** offene Landschaften, mit Hecken, Feldern, Wiesen, Felsen, Gehölzen, zum Teil tagaktiver Standvogel
- **Merkmale:** wippt bei Beunruhigung auf und ab, fliegt schnell, Oberseite braun, Scheitel fein weiß gesprenkelt, Oberseite kräftiger weiß gesprenkelt, Unterseite weiß du braun gestreift, weißer Überaugstreif, Iris gelb, Schnabel graugelb, **Jugendkleid** Gefieder matt und ohne weiße Flecken am Scheitel
- **Nahrung:** Ansitzjäger, Feldmaus, andere Mäuse, Insekten, Käfer, Vögel, Regenwürmer
- **Fortpflanzung:** brütet in Baumhöhlen, Steinhöhlen und Gebäuden, Eiablage zwischen Mitte April und Mitte Mai, 3-5 weiße Eier, Weibchen brütet 25-30 Tage, Männchen besorgt das Futter, die Jungen verlassen die Bruthöhle mit 35 Tagen, mit 2 Wochen sind sie flügge
- **Stimme:** Ruft scharf „KII-jo“ oder „kwiew“, wird wiederholt, Warnruf hoch „kji-kji-kji-kji“, **Weibchen** ruft höher, Bettelrufe der Jungen „schrii“
- **Ordnung:** Eulen
- **Familie:** Eigentliche Eulen
- **Gattung:** Steinkäuze



Steinkauz im Flug

Sperlingskauz (*Glaucidium passerinum*)

- Körperlänge: 15-19cm
- Gewicht: Männchen 59g
Weibchen 99g
- Verbreitung: Mitteleuropa, Schweiz, Österreich, Ostfrankreich
- Lebensraum: Nadel- und Mischwälder, Dämmerungsaktiver Standvogel
- Merkmale: klein, fliegt schnell, im sitzen zuckt er mit dem Schwanz, weißer Überaugstreif, gelbe Iris, heller Nackenfleck, Oberseite graubraun, weiß gesprenkelt, Unterseite weißlich mit brauner Brust, gestreift, Jugendkleid ähnlich Altvogel, ohne weiße Flecken
- Nahrung: Wühlmäuse, Kleinvögel, andere Mäuse
- Fortpflanzung: Höhlenbrüter in Fichtenbäumen, 4-6 weiße Eier, Weibchen brütet 28-30 Tage, Männchen besorgt Futter, die Jungen bleiben 4-5 Wochen im Nest, Ästlinge mit 4 Wochen
- Stimme: Weibchen ruft „tsiih“, „Gesang pfeifend, bei Erregung „hjök“

Waldkauz (Stix aluco)

- **Körperlänge:** 37-43cm
- **Gewicht:** 330-630g
- **Verbreitung:** Europa, China, Korea, Iran
- **Lebensraum:** Wälder, Parks mit Laubbäumen, nachtaktiver Standvogel
- **Merkmale:** fliegt schnell, Gefieder graubraun oder rostbraun mit dunklen Flecken, Schleier weiß mit dünnen Strichen, Augen schwarz, Schulterfedern mit weißen Punkten, **Jugendkleid** in den ersten Wochen noch mit Dunenfedern, Gesichtsmuster unvollständig
- **Nahrung:** Ansitzjäger und Suchjäger, Kleinvögel, Mäuse, Wühlmäuse
- **Fortpflanzung:** Höhlenbrüter in alten bäumen, Felshöhlen und Dachböden, Eiablage im Februar oder März, 2-6 weiße Eier, Weibchen brütet 30 Tage lang, die jungen verlassen mit 30-35 Tagen das Nest und sind Ästlinge, mit 7 Wochen sind sie flügge , mit 10 Wochen selbständig
- **Stimme:** Ruft laut wiederholt „kju-wlck“, Gesang „hUUUuh“, Bettelruf der Jungen „psll-ip“
- **Ordnung:** Eulen
- **Familie:** eigentliche Eulen
- **Gattung:** Käuze

Waldkauz
Verbreitung





Waldkauz

Waldkauz Ästling



Waldkauz in Grau



Waldkauz Abbildung



Waldkauz in rostbraun